

# PICC

Catèter venós central d'inserció perifèrica.



## Què és un PICC?

És un catèter venós central d'inserció perifèrica, que té com a finalitat poder rebre tractament endovenós repetidament amb fàrmacs que tenen una gran capacitat de lesionar les venes de petit calibre.

El PICC s'inserta al braç, amb ajuda de l'ecògraf i arriba fins una vena de gran calibre del tòrax. Aquest catèter interferirà de forma mínima en la vostra vida quotidiana.

## Qui me'l posarà?

Us serà implantat per l'Equip de Teràpia Intravenosa, format per personal infermer expert en venopuncions per ecografia. Se us posarà utilitzant una tècnica estèril i durant la inserció se us administrarà anestèsia local.

## Com l'he de cuidar?

- **No manipuleu la zona** ni retireu l'apòsit que el protegeix.
- **No el mulleu** (no podeu realitzar banys d'immersió ni a la banyera, ni a la piscina ni al mar).
- **Protegiu-lo** amb paper transparent de cuina o amb accessoris impermeables dissenyats per evitar que es mulli durant la higiene personal diària.
- **Eviteu estrebades i cops.** Si conviu amb mascotes, vigileu amb les esgarrapades i mossegades en aquesta zona.
- **No carregueu el braç amb pesos** excessius. (5 Kg màxim).
- **Utilitzeu mànigues amples** que no estrenyin la zona on està el PICC
- Conserveu i **porteu sempre** a la cartera **la targeta identificativa del PICC**
- Eviteu l'ús de **probiòtics** mentre porteu el catèter

## Què més he de saber?

- **Cal que reviseu diàriament el punt d'entrada del catèter.**
- **Cal que aneu a l'hospital setmanalment a curar el PICC.** Un membre de l'Equip de Teràpia Intravenosa vetllarà pel seu bon funcionament.

## Es pot utilitzar el PICC per fer anàlisi de sang?

- **Sí que se'n poden fer.**
- Hi ha models de PICC que permeten **l'administració de contrastos a alta pressió.** (l'Equip de Teràpia Intravenosa us informarà de si el vostre els admet).

## Senyals d'alarma

- **Sortida parcial o total del catèter** (en cas de **sortida total del catèter** a l'exterior, pressioneu el punt d'entrada amb una gassa neta)
- **Dolor o coïssor intens** a la zona del PICC.
- **Febre de 38°C.**
- **Canvi de coloració del braç o inflamació de la zona.**
- **Inflor del braç.**

Si presenteu qualsevol d'aquests símptomes, contacteu amb **L'EQUIP DE TERÀPIA INTRAVENOSA**

- **Hospital dia Oncologia.**  
93 875 93 00 - ext. 5500 -5501
- **Infermeria Radiològica.** 93 875 93 00 - ext. 7086

### Horari:

- De dilluns a dijous de 07.30 h a 18.30 h
- Divendres de 07.30 h a 15.30 h

Fora d'aquests horaris dirigiu-vos **al servei d'URGÈNCIES d'ALTHAIA.**