

PICC

Catèter venós central
d'inserció perifèrica.



Què és un PICC?

És un catèter venós central d'inserció perifèrica, que té com a finalitat poder rebre tractament endovenós repetidament amb fàrmacs que tenen una gran capacitat de lesionar les venes de petit calibre.

El PICC s'inserta al braç, amb ajuda de l'ecògraf i arriba fins una vena de gran calibre del tòrax. Aquest catèter interferirà de forma mínima en la vostra vida quotidiana.

Qui me'l posarà?

Us serà implantat per l'Equip de Teràpia Intravenosa, format per personal infermer expert en venopuncions per ecografia. Se us posarà utilitzant una tècnica estèril i durant la inserció se us administraran anestèsia local.

Com l'he de cuidar?

- **No manipuleu la zona** ni retireu l'apòsit que el protegeix.
- **No el mulleu** (no podeu realitzar banys d'immersió ni a la banyera, ni a la piscina ni al mar).
- **Protegiu-lo** amb paper transparent de cuina o amb accessoris impermeables dissenyats per evitar que es mulli durant la higiene personal diària.
- **Eviteu estrebades i cops.** Si conviu amb mascotes, vigileu amb les esgarrapades i mossegades en aquesta zona.
- **No carregueu el braç amb pesos** excessius. (5 Kg màxim).
- **Utilitzeu mànigues amples** que no estrenyin la zona on està el PICC
- Conserveu i **porteu sempre** a la cartera **la targeta identificativa del PICC**
- Eviteu l'ús de **probiòtics** mentre porteu el catèter

Què més he de saber?

- **Cal que reviseu diàriament el punt d'entrada del catèter.**
- **Cal que aneu a l'hospital setmanalment a curar el PICC.** Un membre de l'Equip de Teràpia Intravenosa vetllarà pel seu bon funcionament.

Es pot utilitzar el PICC per fer anàlisi de sang?

- **Sí que se'n poden fer.**
- Hi ha models de PICC que permeten **l'administració de contrastos a alta pressió.** (l'Equip de Teràpia Intravenosa us informaran de si el vostre els admet).

Senyals d'alarma

- **Sortida parcial o total del catèter** (en cas de sortida total del catèter a l'exterior, pressioneu el punt d'entrada amb una gassa neta)
- **Dolor o coïssor intens** a la zona del PICC.
- **Febre de 38°C.**
- **Canvi de coloració del braç o inflamació de la zona.**
- **Inflor del braç.**

Si presenteu qualsevol d'aquests símptomes, contacteu amb **L'EQUIP DE TERÀPIA INTRAVENOSA**

- **Hospital dia Oncologia.**
93 875 93 00 - ext. 5500 -5501
- **Infermeria Radiològica.** 93 875 93 00 - ext. 7086

Horari:

- De dilluns a dijous de 07.30 h a 18.30 h
- Divendres de 07.30 h a 15.30 h

Fora d'aquests horaris dirigiu-vos **al servei d'URGÈNCIES d'ALTHAIA.**