

Informació per a pacients i familiars

Preparació prèvia a la realització del test de metacolina



Si us han programat una prova de provocació inespecífica (test de metacolina), és molt important que seguïu les recomanacions que us detallem a continuació.

Retirada de medicació

A continuació us indiquem els fàrmacs que heu de deixar de prendre abans de la realització de la prova. Si us sorgeixen dubtes sobre la medicació que preneu cal que ho consulteu amb el vostre metge de capçalera.

És important i imprescindible que en cas de no poder suspendre alguna medicació ho comuniqueu a programació ambulatoria trucant al telèfon 93 875 93 00).

- **Una setmana abans de la prova** no podreu prendre antihistamítics.
- **48 hores abans de la prova** caldrà que deixeu de prendre la següent medicació:
 - **Medicació broncodilatadora de llarga durada inhalada:** Salmeterol (Seretide®, Plusvent®, Anasma®), Formeterol (Simbicort®, Duoresp®, Biresp®, Foster®, Formodual®, Flutiform®), Tiotropi, Montelukast (Singulair®).
 - **Teofil·lina oral**
- **24 hores abans de la prova** no podreu prendre la següent medicació:
 - **Medicació broncodilatadora de curta durada:** Ventolin®, Butoasma®, Terbasmin®, Atrovent®.

- **Corticoides inhalats:** Budesonida (Pulmicort®), Fluticasona (Flixotide®)

Altres recomanacions

- Si sou fumador, no podreu fumar les 24 hores abans de la prova.
- Si us han posat alguna vacuna, haureu d'esperar 2 setmanes per a la realització de la prova.
- El dia de la prova heu de portar la llista de medicaments que esteu prenent.
- No heu de venir en dejú.
- En cas d'intervenció quirúrgica, de malaltia infecciosa, de crisi asmàtica o d'infart recent cal que ho comuniqueu a la infermera abans de la realització de la prova.

Per a més informació podeu descarregar-vos al mòbil l'app d'Althaia

