

Recomanacions anticoagulant oral Apixaban (Eliquis®)

Recomanacions per l'administració

- Cal prendre la dosi exacta prescrita. Es recomana prendre'l a les 09:00h i a les 21:00h. No és necessari estar en dejú.
- Les càpsules s'han de prendre senceres.
- És possible que a l'inici del tractament amb tingueu molèsties gastrointestinals (gastritis, dispèpsia, nàusees o diarrea)
- Si oblideu prendre la medicació, ho podeu fer immediatament si no han transcorregut més de 6 hores i, després seguiu amb la dosi recomanada. Mai es pot duplicar la dosi per compensar un oblit anterior.
- No suspengueu el tractament sense comunicar-ho al metge.

Utilització d'altres fàrmacs

- L'Apixaban (Eliquis®) està contraindicat si esteu en tractament amb KETOCONAZOL, VORICONAZOL, POSACONAZOL, ITRACONAZOL i RITONAVIR.
- No podeu prendre fàrmacs que continguin ÀCID ACETIL SALICILIC (ASPIRINA, AAS), CLOPIDOGREL o antiinflamatoris no esteroïdes (AINES).
- Eviteu els fàrmacs com: RIFAMPICINA, HERBA DE SANT JOAN, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL i FENITOINA. Poden disminuir l'efecte anticoagulant del Apixaban (Eliquis®). Cal comunicar-ho al metge si us els recepten.

Tingueu especial atenció

- La vostra activitat i tipus de vida poden ser normals. Tingueu especial precaució amb la manipulació d'objectes tallants (tissores, ganivets, màquines d'afaitar..., etc.).
- Estan contraindicades les injeccions intramusculars. No està contraindicada l'administració d'insulina, vacunes, ...
- Cal especial atenció amb les activitats on es puguin produir traumatismes o caigudes.
- Vigileu els sagnats anormals (hemorràgies) de genives, nas, orina, matèries fecals, etc... així com l'aparició d'hematomes (blaus o morats) a la pell i a les mucoses. Si això passesu consulteu al **servei d'hematologia** (Agenda del Sintrom).
- En cas de sagnat, suspeneu immediatament la medicació anticoagulant i aneu al seu SERVEI D'URGÈNCIES més proper. Si us és possible porteu aquest full.
- Si teniu visita amb l'odontòleg, o si us heu de sotmetre a intervencions quirúrgiques, biòpsies o endoscòpies, prèviament haureu de sol·licitar visita al **servei d'hematologia** (Agenda del Sintrom).
- En cas de sospita d'embaràs, cal comunicar-ho immediatament al metge que us ha receptat l'anticoagulant, o al metge de capçalera.
- L'Apixaban (Eliquis®) està contraindicat en cas d'insuficiència renal greu (Cl Creat <15ml/h).
- Si us diagnostiquen insuficiència renal o hepàtica greu, algun trastorn de la coagulació o plaquetes baixes, cal comunicar-ho immediatament al metge que us ha receptat l'anticoagulant o al metge de capçalera.
- Cal que porteu aquest full entre els vostres documents d'identitat. En cas d'accident podria ser de gran utilitat per als serveis d'emergències.