

# ADMINISTRACIÓ D'ANTICOAGULANT ORAL DABIGATRAN (PRADAXA®)



## Recomanacions per a l'administració:

- Heu de prendre l'anticoagulant Dabigatran (Pradaxa®) segons la dosi exacta prescrita: cada dia, dos cops al dia, a la mateixa hora aproximadament, recomanem a les 9 h del matí i a les 21 h de la nit.
- Heu de prendre les càpsules senceres.
- A l'inici del tractament amb Dabigatran (Pradaxa®) pot ser que presenteu molèsties gastrointestinals tipus gastritis, dispèpsia, nàusees o diarrea.
- Recomanem prendre la dosi després d'esmorzar i de sopar.
- Si oblideu una dosi de l'anticoagulant Dabigatran (Pradaxa®), us la podeu prendre si no han passat més de 6 h des de l'oblit. Sinó, espereu la següent dosi.
- No suspengueu el tractament amb Dabigatran (Pradaxa®) sense consultar primer al vostre metge.

## Utilització d'altres fàrmacs:

- El Dabigatran (Pradaxa®) està contraindicat si esteu prenent tractament amb KETOCONAZOL, CICLOSPORINA, ITRACONAZOL I TACROLIMUS
- No prengueu mai fàrmacs que continguin ACID ACETIL SALICÍLIC (ASPIRINA, AAS), CLOPIDOGREL o antiinflamatoris no esteroides (AINES).
- Els fàrmacs com: AMIODARONA, VERAPAMIL, CLARITROMICINA o QUINIDINA poden augmentar l'efecte anticoagulant del Dabigatran (Pradaxa®), en cas que us receptin comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant o el metge de capçalera.
- Els fàrmacs com: RIFAMPICINA, HERBA DE SANT JOAN, CARBAMAZEPINA i FENITOINA poden disminuir l'efecte anticoagulant del Dabigatran (Pradaxa®) i s'han d'evitar. En cas que us en receptin comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant o el metge de capçalera.

## Tingueu especial atenció:

- El Dabigatran (Pradaxa) està contraindicat si teniu una insuficiència renal greu (Cl Creat <30ml/h).
- No us poseu mai injeccions intramusculars
- Tingueu precaució amb la manipulació d'objectes tallants (tissores de manicura, de cuina, ganivets, maquineta d'afaitar, etc).
- Si heu d'anar a l'odontòleg, sotmetre-us a intervencions quirúrgiques, biòpsies o endoscòpies SOL·LICITEU VISITA AL SERVEI D'HEMATOLOGIA (Agenda del Sintrom).
- Tan aviat com sospiteu un embaràs comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant Dabigatran (Pradaxa®) o al vostre metge de capçalera.
- Si us diagnostiquen insuficiència renal o hepàtica greu, algun trastorn de la coagulació o plaquetes baixes, tan aviat com us ho diguin comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant Dabigatran (Pradaxa®) o al metge de capçalera.
- Vigileu les pèrdues anormals de sang (hemorràgies) per genives, nas, orina, matèries fecals, etc, així com l'aparició d'hematomes (blaus, morats) a la pell i mucoses. Si això passés, heu de consultar al SERVEI D'HEMATOLOGIA.
- Si sagnéssiu abundantment per qualsevol lloc, suspeneu immediatament la medicació anticoagulant i acudiu d'immediat al vostre SERVEI D'URGÈNCIES més proper amb aquest full de recomanacions, si és possible.
- Conserveu aquest full entre els vostres documents d'identitat, perquè en cas d'accident, serà de gran utilitat pels qui us atenguin.

Infermera responsable Servei d'Hematologia  
Althaia, Xarxa assistencial de Manresa