

RECOMANACIONS PER L'ADMINISTRACIÓ

- Cal prendre l'anticoagulant (Edoxaban, Lixiana®) **un cop al dia**, segons la dosi exacta prescrita. Ho heu de fer **a la mateixa hora aproximadament**. Us recomanem fer-ho a les 09h del matí, després d'esmorzar.
- Les càpsules **s'han de prendre senceres**.
- A l'inici del tractament poden aparèixer molèsties gastrointestinals (gastritis, dispèpsia, nàusees o diarrea).
- **Si oblideu una dosi**, la podeu prendre immediatament i seguir l'endemà amb la dosi recomanada d'un cop al dia. Mai es pot duplicar la dosi d'un dia per compensar un oblit.
- No suspengueu el tractament sense consultar abans amb el vostre metge.

UTILITZACIÓ D'ALTRES FÀRMACS

- No prengueu mai fàrmacs que continguin **ACID ACETIL SALICILIC (ASPIRINA, AAS), CLOPIDOGREL o antiinflamatoris no esteroïdes (AINES)**.
- Els **fàrmacs inhibidors de la glucoproteïna P (Pgp)** (CICLOSPORINA, DRONEDARONA, ERITROMICINA, KETOCONAZOL) poden augmentar l'efecte anticoagulant de l'Edoxaban (Lixiana®). En cas que us en receptin comuniqueu-ho al vostre metge.
- Els fàrmacs com **RIFAMPICINA, HERBA DE SANT JOAN, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL i FENITOINA** poden disminuir l'efecte anticoagulant de l'Edoxaban (Lixiana®) i s'han d'evitar. En cas que us en receptin comuniqueu-ho al vostre metge.

CAL TENIR ESPECIAL ATENCIÓ

- L'Edoxaban (Lixiana®) està **contraindicat** si teniu una insuficiència renal greu (Cl Creat <15ml/h).
- **No us poseu mai injeccions intramusculars**.
- Cal tenir **precaució amb la manipulació d'objectes tallants** (tissores de manicura, de cuina, ganivets, maquineta d'afaitar, etc).
- **Si heu d'anar a l'odontòleg o si us heu de sotmetre a una intervenció quirúrgica, biòpsia o endoscòpia SOL·LICITEU VISITA AL SERVEI D'HEMATOLOGIA** o al vostre metge de capçalera.

- **Si sospiteu que esteu embarassada** comuniqueu-ho immediatament al vostre metge.
- Si us diagnostiquen **insuficiència renal o hepàtica greu, algun trastorn de la coagulació o plaquetes baixes** cal comunicar-ho immediatament al vostre metge.
- **Cal vigilar les pèrdues anormals de sang** (hemorràgies) per genives, nas, orina, matèries fecals, etc així com l'aparició d'hematomes (blaus, morats) a la pell i mucoses. Si això passés, consulteu al SERVEI D'HEMATOLOGIA o al vostre metge de capçalera.
- **Si sagneu abundantment** per qualsevol lloc, suspeneu immediatament la medicació anticoagulant i acudeixi d'immediat al SERVEI D'URGÈNCIES més proper amb aquest full de recomanacions, si és possible.
- **Conserveu aquest full** entre els seus documents d'identitat, perquè en cas d'accident, serà de gran utilitat pels qui us atenguin.