

RECOMANACIONS DURANT L'ADMINISTRACIÓ D'ANTICOAGULANT ORAL RIVAROXABAN (XARELTO®) Servei d'Hematologia



Recomanacions per l'administració

- Heu de prendre l'anticoagulant Rivaroxaban (Xarelto®) un o dos cops al dia, segons la dosi exacta prescrita: recomanem a les 9:00 i a les 21:00. I, si és un sol cop al dia, millor peneu-la a les 9:00.
- Les càpsules les heu de prendre senceres.
- A l'inici del tractament amb Rivaroxaban (Xarelto®) pot ser que tingueu molèsties gastro-intestinals tipus gastritis, dispèpsia, nàusees o diarrea.
- Les càpsules de Rivaroxaban (Xarelto®) les heu de prendre amb aliments.
- Si us oblideu una dosi de l'anticoagulant Rivaroxaban (Xarelto®) us la podeu prendre immediatament i seguir, al dia següent, amb la dosi recomanada d'un cop al dia. Mai heu de duplicar la dosi d'un dia per compensar un oblit anterior.
- No suspengueu el tractament amb Rivaroxaban (Xarelto®) sense consultar primer el vostre metge.

Utilització d'altres fàrmacs

- El Rivaroxaban (Xarelto®) està contraindicat si esteu prenent tractament amb: KETOCONAZOL, VORICONAZOL, POSACONAZOL, ITACONAZOL, DRONEDARONA i RITONAVIR.
- No prengueu mai fàrmacs que continguin ÀCID ACETIL SALICÍLIC (ASPIRINA, AAS), CLOPIDOGREL o antiinflamatoris no esteroides (AINES).
- Els fàrmacs com: CLARITROMICINA, ERITROMICINA i TELITROMICINA poden augmentar l'efecte anticoagulant del Rivaroxaban (Xarelto®). En cas que us els receptin, comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant o el metge de capçalera.
- Els fàrmacs com: RIFAMPICINA, HERBA DE SANT JOAN, CARBAMAZEPINA, FENOBARBITAL i FENITOINA poden disminuir l'efecte an-

ticoagulant del Rivaroxaban (Xarelto®) i els heu d'evitar. En cas que us els receptin comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant o al metge de capçalera.

Tingueu especial atenció

- El Rivaroxaban (Xarelto®) està contraindicat si teniu una insuficiència renal greu (Cl Creat <15ml/h).
- No us poseu mai injeccions intramusculars.
- Tingueu precaució amb la manipulació d'objectes tallants (tisores de manicura, de cuina, ganivets, maquineta d'afaitar, etc).
- Si heu d'anar a l'odontòleg, sotmetre-us a intervencions quirúrgiques, biòpsies o endoscòpies SOL·LICITEU VISITA AL SERVEI D'HEMATOLOGIA (Agenda del Sintrom).
- Tan aviat com sospiteu un embaràs comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant Rivaroxaban (Xarelto®) o al metge de capçalera.
- Si us diagnostiquen insuficiència renal o hepàtica greu, algun trastorn de la coagulació o plaquetes baixes, tan aviat com us ho diguin comuniqueu-ho al metge que us ha receptat l'anticoagulant Rivaroxaban (Xarelto®) o al metge de capçalera.
- Vigileu les pèrdues anormals de sang (hemorràgies) per genives, nas, orina, matèries fecals, etc, així com l'aparició d'hematomes (blaus, morats) a la pell i mucoses. Si això passés heu de consultar al SERVEI D'HEMATOLOGIA.
- Si sagneu abundantment per qualsevol lloc, suspeneu immediatament la medicació anticoagulant i acudiu d'immediat al SERVEI D'URGÈNCIES més proper amb aquest full de recomanacions, si és possible.
- Conserveu aquest full entre els vostres documents d'identitat perquè, en cas d'accident, serà de gran utilitat per als qui us atenguin.

RECOMENDACIONES DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICOAGULANTE ORAL RIVAROXABAN (XARELTO®) Servicio de Hematología



Recomendaciones para la administración

- Debe tomar el anticoagulante Rivaroxaban (Xarelto®) una o dos veces al día, según la dosis exacta prescrita (cada dia, a la misma hora aproximadamente), recomendamos a las 9:00h y a las 21:00h. O bien, si es una sola vez al día, mejor tomarla a las 9:00h.
- Las cápsulas las debe tomar enteras.
- Al inicio del tratamiento con Rivaroxaban, (Xarelto®) puede ser que presente molestias gastrointestinales tipo gastritis, dispepsia, náuseas o diarrea.
- Las capsulas de Rivaroxaban (Xarelto®) las debe tomar con los alimentos.
- Si olvida una dosis del anticoagulante Rivaroxaban (Xarelto®), la puede tomar inmediatamente y seguir al día siguiente con la dosis recomendada de una vez al día. Nunca debe duplicar la dosis de un día para compensar un olvido anterior.
- No suspenda el tratamiento anticoagulante con Rivaroxaban (Xarelto®) sin consultar primero con su médico.

Utilización de otros fármacos

- El Rivaroxaban (Xarelto®) está contraindicado si está tomando alguno de estos tratamientos como: KETOCONAZOL, VORICONAZOL, POSACONAZOL, ITRACONAZOL, DRONEDARONA y RITONAVIR.
- No tome nunca fármacos que contengan ACIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINA, AAS), CLOPIDOGREL o antiinflamatorios no esteroideos (AINES).
- Los fármacos como: CLARITROMICINA, ERITEROMICINA y TELITROMICINA pueden aumentar el efecto anticoagulante del Dabigatran (Pradaxa®), en caso de que se lo receten comuníquelo al médico que le ha recetado el anticoagulante o a su médico de cabecera.
- Los fármacos como: RIFAMPICINA, HIERBA DE SANT JOAN, CARBAMAZEPINA, FENOBARBI-

TAL y FENITOINA pueden disminuir el efecto anticoagulante del Rivaroxaban (Xarelto®), en caso de que se lo receten comuníquelo al médico que le ha recetado el anticoagulante o a su médico de cabecera.

Tenga especial atención

- El Rivaroxaban (Xarelto®) está contraindicado si usted tiene una insuficiencia renal grave (Cl Creat <15ml/h).
- No se ponga nunca inyecciones intramusculares.
- Tenga precaución con la manipulación de objetos cortantes (tijeras de manicura, de cocina, cuchillos, máquina de afeitar, etc).
- Si tiene que ir al odontólogo, someterse a intervenciones quirúrgicas, biopsias o endoscopias SOLICITE VISITA AL SERVICIO DE HEMATOLOGIA (agenda del Sintrom).
- Tan pronto como sospeche que está embarazada comuníquelo al médico que le ha recetado el anticoagulante Rivaroxaban (Xarelto®) o a su médico de cabecera.
- Si le diagnostican insuficiencia renal o hepática grave, algún trastorno de la coagulación o plaquetas bajas, tan pronto como se lo digan, comuníquelo al médico que le ha recetado el anticoagulante Rivaroxaban (Xarelto®) o a su médico de cabecera.
- Vigile las pérdidas anormales de sangre (hemorragias) por encías, nariz, orina, materias fecales, etc, así como la aparición de hematomas en la piel y mucosas. Si esto pasa debe consultar al SERVICIO DE HEMATOLOGIA.
- Si sangra abundantemente por cualquier sitio, suspenda inmediatamente la medicación anticoagulante y acuda de inmediato a su SERVICIO DE URGENCIAS más próximo con la hoja de recomendaciones, si es posible.
- Conserve esta hoja entre sus documentos de identidad porqué, en caso de accidente, será de gran utilidad para quien le atienda.