

## Informació per a pacients i familiars

### Teràpia amb bomba elastomèrica a domicili




### Què és el tractament amb bomba elastomèrica amb furosemida?

És l'administració d'un medicament endovenós per augmentar el volum d'orina diari i per millorar la insuficiència cardíaca.

La medicació s'administra contínuament a través d'un dispositiu de plàstic.

### Què cal fer?

- Controleu el vostre pes cada dia amb la bàscula
- Control la diüresi cada dia amb el mesurador subministrat
- Redueu la ingesta de líquids a 1 litre
- Després de dinar, estireu-vos al llit a descansar una hora
- Eviteu les begudes amb gas, i les begudes, tipus Coca-Cola®, Aquarius® i cafè
- No preneu menjar amb sal
- Feu una dieta baixa en greixos
- No preneu productes alimentaris prefabricats o enllau-nats (tipus brou preparat, suc de fruites...)
- No beveu begudes alcohòliques
- Si teniu molt edema a les extremitats inferiors (cames inflades), mantingueu les cames elevades sense fer pressió



### Precaucions a tenir en compte

- Mantingueu la bomba al resguard de la llum
- La bomba elastomèrica sempre està connectada, no manipuleu la via endovenosa
- Si es perd la via endovenosa o us fa mal truqueu al telèfon d'urgència que us hem facilitat
- No prengueu la medicació diürètica com Seguril (Furosemida), que prenieu abans de l'ingrés
- Estigueu atents als símptomes com ofec, augment dels edemes, augment de pes,...
- Si no enteneu algun aspecte o teniu algun dubte o temor, no decidiu pel vostre compte, consulteu amb l'equip d'hospitalització a domicili